Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central

ANÁLISIS DE CASO

1. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre: Augusto Lizardo Arrecis Gramajo

No. De Afiliación: 2344014350901

Edad: 80 años

Unidad: Hospital General de Quetzaltenango

Medicamento: Ramipril **Código Medi-Igss:** 2003

Marca del medicamento: Caplin Point

No. De registro sanitario: PF-42747.

No. De lote: C017G24.

Notificación: Rash y prurito en todo el cuerpo. (01/11/2024)

2. EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE CLÍNICO Y PRUEBAS COMPLEMENTARIAS:

a) Diagnósticos activos:

- i. Hipertensión esencial (primaria) (08/2015)
- ii. Amiloidosis de la piel (04/2022)
- iii. Insuficiencia renal crónica grado 3b (05/2022)
- iv. Tiña del cuerpo (tinea corporis)
- v. Prurito
- vi. Trastornos de los leucocitos, no especificado
- vii. Trastorno del metabolismo de los esfingolípidos y otros trastornos por almacenamiento de lípidos
- viii. Hipercolesterolemia pura

b) Tratamientos prescritos:

- i. Ramipril, tableta o cápsula 5 mg; una al día.
- ii. Colestiramina, polvo sobre 4 g; una al día.
- iii. Atorvastatina, tableta 20 mg; una por las tardes.
- iv. Alopurinol, tableta o cápsula de 300 mg; tomar 1 cada 24 horas.
- v. Furosemida, tableta 40 mg; tomar media tableta cada 24 horas.
- vi. Desloratadina, tableta o cápsula 5 mg; tomar media tableta.

c) Evolución

i. **Signos Vitales:** No aplica

ii. **Evaluaciones Clínicas:**

12/04/2024 Medicina Interna: datos subjetivos: paciente refiere estar asintomático, adecuados niveles de presión arterial tomado de forma ambulatoria, pero indica que desde que toma marca de Ramipril empieza con prurito.

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central

15/06/2023 Enfermedad común/apoyo a dermatología: paciente refiere que persiste con prurito en la región de la espalda. Datos objetivos: paciente presenta resequeidad y leve escamosidad en piel, refiere que está más controlada, no se aplica en la espalda porque no se lo puede aplicar. Le recetan desloratadina, óxido de zinc y calamina y aceite mineral.

- iii. **Historial uso de medicamento:** inicio 03/08/2015, última prescripción: 14/03/2025
- iv. **Pruebas de laboratorios clínico:** No aplica
- v. **Estudios complementarios relevantes:** no aplica.

3. EVALUACIÓN FARMACOLÓGICA:

a) Reacciones adversas:

i. Ramipril:

- **Trastornos de piel y del tejido subcutáneo:**

- a. **Frecuentes:** exantema en particular maculopapular.
- b. **Poco frecuentes:** angioedema, prurito, hiperhidrosis.

ii. Atorvastatina:

- **Trastornos de la piel y del tejido subcutáneo:**

- a. **Poco frecuente:** urticaria, erupción cutánea, prurito, alopecia.

iii. Alopurinol:

- **Trastornos de piel y del tejido subcutáneo:**

- a. **Frecuentes:** erupción cutánea (rash).

iv. Furosemida:

- **Trastornos de piel y del tejido subcutáneo:**

- a. **Poco frecuentes:** prurito, urticaria, erupciones, dermatitis bullosa, eritema multiforme, penfigoide, dermatitis exfoliativa, púrpura, reacción de fotosensibilidad.

b) Interacciones farmacológicas:

- i. **Alopurinol + Ramipril:** vigilancia de cerca. La coadministración de alopurinol con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) se ha asociado con un riesgo de reacciones de hipersensibilidad graves, neutropenia, agranulocitosis e infecciones graves. Se recomienda precaución si se prescribe alopurinol en combinación con un inhibidor de la ECA, especialmente en ancianos y pacientes con insuficiencia renal. Se recomienda la monitorización periódica del recuento de glóbulos blancos.

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central

Se debe aconsejar a los pacientes que suspendan inmediatamente estos medicamentos y busquen atención médica si presentan disnea; constricción de garganta; hinchazón de cara, labios o lengua; urticaria; erupción cutánea; fiebre; artralgia; o mialgia. Los pacientes también deben contactar a su médico si notan signos de infección o experimentan fiebre, escalofríos, dolor de garganta, letargo, dolores corporales u otros síntomas similares a los de la gripe.

- ii. **Furosemida + Ramipril:** Aunque se combinan con frecuencia en la práctica clínica, los diuréticos y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) pueden tener efectos aditivos. La coadministración aumenta la probabilidad de hipotensión e hipovolemia que la administración de cualquiera de los fármacos por separado.

4. ALGORITMO DE DECISIÓN DIAGNÓSTICA

A. Secuencia temporal		
1. COMPATIBLE	(+2)	
2. COMPATIBLE PERO NO COHERENTE	(+1)	+1
3. NO HAY INFORMACION	(0)	
4. INCOMPATIBLE	(-1)	
5. REACCIÓN APARECE DESPUÉS DEL RETIRO DEL MEDICAMENTO	(+2)	

B. Conocimiento previo		
1. REACCIÓN BIEN CONOCIDA	(+2)	
2. REACCIÓN CONOCIDA EN REFERENCIAS OCASIONALES	(+1)	+1
3. REACCIÓN DESCONOCIDA	(0)	
4. EXISTE INFORMACION EN CONTRA DE LA RELACIÓN	(-1)	

C. Efecto de retirada del medicamento		
1. LA REACCIÓN MEJORA	(+2)	
2. LA REACCIÓN NO MEJORA	(-2)	
3. NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA REACCIÓN NO MEJORA	(+1)	+1
4. NO SE RETIRA EL MEDICAMENTO Y LA REACCIÓN MEJORA	(-2)	
5. NO HAY INFORMACIÓN	(0)	
6. REACCIÓN MORTAL O IRREVERSIBLE	(0)	
7. NO SE RETIRA, REACCIÓN MEJORA POR TOLERANCIA	(+1)	
8. NO SE RETIRA, REACCIÓN MEJORA POR TRATAMIENTO	(+1)

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central

D. Efecto de reexposición al medicamento sospechoso		
1. POSITIVA: APARECE LA REACCIÓN	(+3)	+3
2. NEGATIVA: NO APARECE LA REACCIÓN	(-1)	
3. NO HAY REEXPOSICIÓN O INFORMACIÓN INSUFICIENTE	(0)	
4. REACCIÓN MORTAL O IRREVERSIBLE	(0)	
5. REACCIÓN PREVIA SIMILAR	(+1)	

E. Existencia de causas alternativas		
1. EXPLICACIÓN ALTERNATIVA MAS VEROSIMIL	(-3)	-3
2. EXPLICACIÓN ALTERNATIVA IGUAL O MENOS VEROSIMIL	(-1)	
3. NO HAY INFORMACIÓN PARA UNA EXPLICACIÓN ALTERNATIVA	(0)	
4. INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA DESCARTAR LA ALTERNATIVA	(+1)	

F. Factores contribuyentes que favorecen la relación de causalidad		
	(+1)	0

G. Exploraciones complementarias		
	(+1)	0

H. Gravedad		
i. NO SERIO		1
ii. SERIO		
iii. GRAVE		

TOTAL:		
		4

5. **COMENTARIOS:** Paciente quien inició con el medicamento hace 10 años, por lo que la secuencia temporal es compatible pero no coherente. En la ficha técnica del medicamento, el prurito aparece como una RAM poco frecuente del Ramipril. Según la boleta de notificación de sospecha de RAM el paciente suspendió el medicamento, pero lo volvió a tomar presentando nuevamente el mismo inconveniente. Paciente ha tenido el diagnóstico de prurito desde hace más de 2 años, además fue diagnosticado con Amiloidosis de piel y según las últimas recetas no le han prescrito tratamiento tópico. El alopurinol también puede causar erupción cutánea de manera frecuente.

• **CONCLUSIÓN: RAM Posible**

No Clasificada
Improbable Falta
 < 0

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Subgerencia de Prestaciones en Salud
Dirección Terapéutica Central

Condicional	1 - 3
Posible	4 - 5
Probable	6 - 7
Definida	≥ 8