

NCA98068

Paciente con iniciales : LVA

Medicamento Sopechoso

**Tabla 3. Generalidades de las vacunas antineumocócica PCV23**

Vacuna	Neumococo 23 Valente
<b>Descripción</b>	<p>Vacuna neumocócica polivalente, es una vacuna líquida, estéril, para administración por vía intramuscular o subcutánea. Cada 0,5 ml. de la dosis de la vacuna contiene 25 µg de cada tipo de polisacárido disuelto en solución salina isotónica que contiene 0,25% de fenol como preservante.</p> <p>Los niveles de anticuerpo específicos para el tipo capsular protector por lo general se desarrollan a la tercera semana después de la vacunación.</p> <p>Composición: Cada dosis vacunante (0,5 ml) contiene: polisacáridos purificados de <i>Streptococcus pneumoniae</i>: 0,025 mg de cada uno de los serotipos siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F; fenol (conservante) 1,25 ml como máximo; solución tamponada isotónica c.s.p. 0,5 ml. Composición de la solución tamponada isotónica: cloruro de sodio 4,15 mg; fosfato de sodio dibásico 0,065 mg; fosfato de potasio monobásico 0,023 mg; agua para inyecciones 0,5 ml.</p>

14

<b>Presentación</b>	Unidosis
<b>Esquema de vacunación</b>	Esquema regular; dosis única para adultos con factores de riesgo prioritizados*. Ver situaciones especiales Adultos mayores de 60 años
<b>Dosis, vía de administración y sitio de aplicación</b>	0.5 ml. vía intramuscular en el músculo deltoides Se utiliza la jeringa de 1cc con aguja de 23G x 1 pulgada o jeringa autoactivable de 0.5cc, 23G x 1 pulgada.
<b>Contraindicaciones</b>	Alergia a cualquier componente de la vacuna. No aplicar a menores de 2 años.
<b>ESAVI</b>	<p><b>Leves:</b></p> <p>Fiebre (<math>\leq 38,8^{\circ}\text{C}</math>) y reacciones en el sitio de la inyección consistentes en dolor, eritema, calor, inflamación e induración local. Raras ocasiones se informaron reacciones del tipo de celulitis. Estas muestran un tiempo de inicio corto tras la administración de la vacuna y fueron de naturaleza transitoria.</p> <p>También se describieron de forma infrecuente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema digestivo: náuseas y vómitos</li><li>• Sistema hematológico/linfático: linfadenitis, trombocitopenia en pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica en pacientes con trastornos hematológicos.</li><li>• <del>Urticaria, hinchazón, eritema, inflamación, enrojecimiento del sitio de inyección.</del></li></ul>